

01 O número de leitos é um critério utilizado para a classificação de hospitais. Assim sendo um hospital com 120 leitos é classificado como

- a) pequeno porte
- b) médio porte
- c) grande porte
- d) porte especial
- e) especial

02 Está correto afirmar que:

- a) As compressas úmidas frias deverão ser aplicadas nas regiões fronto-temporal, axilar e inguinal bilateral para promover a redução da temperatura corporal devido a vasodilatação dos vasos calibrosos
- b) Na verificação da pressão arterial (PA), o som do primeiro batimento corresponde a pressão diastólica e o desaparecimento ou abafamento do mesmo corresponde a pressão sistólica
- c) As feridas devem ser limpas com solução fisiológica fria para estimular a cicatrização e diminuir a dor
- d) A pessoa em estado terminal apresenta inquietações psicológicas que são evidenciadas pelas fases de negação e isolamento, raiva, barganha, depressão e aceitação
- e) Ao realizar curativo de ferida contaminada deve-se iniciar a limpeza do centro para as bordas da ferida

03 O sr. R.S., está internado há dois dias em um hospital geral em clínica médica e, deverá ser transferido para a clínica cirúrgica do mesmo hospital. Neste caso:

- a) o prontuário deverá seguir com o paciente com os devidos registros de enfermagem
- b) o paciente terá sua alta assinada e será aberto outro prontuário para admiti-lo na clínica cirúrgica
- c) o prontuário será mantido na clínica de origem até que o paciente receba alta
- d) o prontuário será encaminhado para o SAME com os devidos registros de enfermagem
- e) prontuário deverá ser encaminhado para o setor de contas hospitalares com os devidos registros de enfermagem

04 Dentre as atividades do auxiliar de enfermagem, destaca-se o registro de todas as observações e assistência prestada ao paciente. A partir desta assertiva pode-se afirmar que:

- a) o prontuário do paciente agrega informações sigilosas e por isso o paciente não tem o direito de ter acesso a esse documento
- b) após fazer o registro no prontuário do paciente, o auxiliar de enfermagem deve apor o número

de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, em cumprimento a Lei nº 7.498/86 que regulamenta o exercício da Enfermagem

- c) após fazer o registro no prontuário do paciente, o auxiliar de enfermagem deve apor o número de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, em cumprimento ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem
- d) o prontuário do paciente é um documento que agrega um conjunto de impressos utilizados somente pela equipe de enfermagem e pela equipe médica
- e) a observação do estado geral do paciente inclui apenas as condições físicas relacionadas ao estado nutricional, hidratação, oxigenação, postura e movimentação

05 Os artigos hospitalares utilizados nos pacientes, são classificados conforme o grau de risco de provocar infecção hospitalar. Assim sendo, a única alternativa correta é:

- a) o processo de desinfecção de artigos hospitalares é a destruição de todas as formas de vida microbiana
- b) os artigos hospitalares, como comadre, papagaio e termômetros são classificados como artigos semi-críticos
- c) as agulhas e os cateteres intravasculares são artigos críticos, porém a esterilização não é obrigatória, há indicação de desinfecção de alto nível
- d) artigos não-críticos são materiais que entram em contato com a pele lesada
- e) os materiais que entram em contato com mucosa íntegra e pele não intacta são classificados como artigos semi-críticos

06 A unidade do paciente é o espaço físico hospitalar onde o paciente permanece a maior parte de sua hospitalização. Referente a limpeza e ao preparo da unidade do paciente, está correto afirmar que:

- a) a limpeza terminal deve ser realizada após alta, óbito, transferência do paciente ou a cada semana em casos de internação prolongada
- b) a limpeza terminal deve ser realizada diariamente após o preparo da cama do paciente
- c) a limpeza concorrente deve ser realizada após alta, óbito, transferência do paciente ou a cada semana em casos de internação prolongada
- d) a cama aberta é preparada pelo pessoal de enfermagem e é indicada para receber um novo paciente na unidade de internação
- e) a cama fechada é preparada pelo pessoal de enfermagem e é indicada para o paciente que tem condições de se locomover

07 Durante a realização do banho no leito, o auxiliar de enfermagem deve avaliar o estado geral do paciente e estabelecer a melhor maneira de realizar este cuidado. Porém, a seqüência lógica do banho no leito em um paciente do sexo masculino, consiste em:

- a) lavar primeiro o rosto, em seguida fazer a higiene oral e dos genitais, lavar a região ventral, o dorso e os membros superiores e inferiores
- b) fazer primeiro a higiene oral, em seguida lavar o rosto, o tronco, os membros e os genitais
- c) lavar primeiro os cabelos e o couro cabeludo, em seguida fazer a higiene oral, lavar o rosto, o tronco, os membros e os genitais
- d) lavar primeiro a região ventral, em seguida o dorso, os membros e os genitais
- e) lavar primeiro o rosto e em seguida o tronco, os membros e os genitais

08 A única alternativa correta é:

- a) na administração de medicamentos por via intramuscular, a agulha é inserida no músculo formando um ângulo de 45° e com o bise lateralizado a fim de evitar lesão nas fibras musculares
- b) a formulação líquida destinada para uso retal em quantidade entre 1000 a 2000 ml é denominada lavagem intestinal
- c) a via intravenosa é utilizada para administrar medicamentos irritantes por ser um processo menos doloroso
- d) a técnica em Z é indicada para aplicação de medicamentos irritantes, porém é uma função privativa do enfermeiro
- e) a região ventroglútea, é uma área provida de grandes vasos e nervos, daí ser o local menos indicado para injeções intramusculares

09 De acordo com a Lei 7.498/86 e o Decreto 94.406/87, instrumentos que regulamentam a Enfermagem no Brasil, a equipe de Enfermagem é constituída por:

- a) enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, parteira e atendente de enfermagem
- b) enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem
- c) enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e atendente de enfermagem

- d) enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira
- e) enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde

10 É comum em um paciente terminal a presença de sinais e sintomas que indicam falência cardiocirculatória, respiratória e neurológica. Considerando que uma das funções do auxiliar de enfermagem é a capacidade de identificar sinais e sintomas, marque a alternativa correta:

- a) pele pálida e fria, sudorese fria e viscosa, dispnéia são sintomas subjetivos e indicam falência respiratória em pacientes terminais
- b) incapacidade de deglutição, relaxamento esfíncteriano e hipotensão arterial são sintomas objetivos e indicam alteração cardiovascular em pacientes terminais
- c) agitação psicomotora, estado de inconsciência e midríase são sintomas objetivos e caracterizam alterações neurológicas em pacientes terminais
- d) midríase significa a contração pupilar em pacientes terminais e indica alteração neurológica
- e) equimose é um sintoma objetivo e caracteriza-se pela cor azulada da pele, mucosa e do leito ungueal em pacientes terminais

11 O sr. R.S., 30 anos, deverá tomar um clister glicerinado. Ao realizar o procedimento, o auxiliar de enfermagem deverá colocar o paciente na seguinte posição:

- a) decúbito dorsal
- b) decúbito lateral direito
- c) decúbito lateral esquerdo
- d) decúbito ventral
- e) decúbito genupeitoral

12 No Brasil, a formação de auxiliares de enfermagem, foi uma iniciativa:

- a) da Associação Brasileira de Enfermagem, em 1926, através das enfermeiras Gleite de Alcântara e Edith Magalhães Fraenkel
- b) da Escola de Enfermagem de Manaus, em 1949, através da Fundação Serviços de Saúde Pública;
- c) da Cruz Vermelha na década de 20
- d) do médico Carlos Chagas, em 1923, no Rio de Janeiro
- e) da enfermeira Laís Neto dos Reis, em 1934, em Belo Horizonte, na Escola de Enfermagem Carlos Chagas

13 Fazer o controle hídrico é uma prescrição de enfermagem e legalmente uma atividade do auxiliar de enfermagem. Por conseguinte a realização desse procedimento abrange:

- a) mensuração de líquidos introduzidos por via oral, parenteral e líquidos eliminados
- b) mensuração da diurese
- c) mensuração de líquidos ingeridos (via oral) e diurese horária
- d) mensuração de líquidos introduzidos por via parenteral e diurese de 24 horas
- e) mensuração de líquidos eliminados: urina, drenagens de sondas, drenos, tubos

14 Você, auxiliar de enfermagem, trabalha em um Setor de Saúde Mental. Durante o seu turno de trabalho, você percebe que um paciente, usuário de drogas, apresenta riscos reais de autodestruição. A conduta de enfermagem é:

- a) providenciar o isolamento desse paciente
- b) manter o paciente sob vigilância, ouvindo-o e estimulando-o a participar das atividades
- c) iniciar a insulino terapia
- d) realizar a contensão mecânica
- e) realizar a contensão química e manter o paciente em repouso absoluto

15 Relação terapêutica é aquela que se estabelece entre um membro da equipe de saúde, os familiares e o paciente. Para que o auxiliar de enfermagem consiga estabelecer uma relação terapêutica com o paciente portador de transtorno mental, faz-se necessário à utilização de algumas técnicas. Dentre essas cita-se:

- a) a contensão mecânica e química
- b) entrevista
- c) a admissão
- d) a escuta ativa
- e) a visita domiciliar

16 A alternativa correta é:

- a) Após a notificação de caso suspeito de febre amarela, deve-se proceder a quimioprofilaxia dos comunicantes domiciliares
- b) É função privativa do enfermeiro, participar da Vigilância de Doenças Transmissíveis, buscando os comunicantes domiciliares para que realizem exames diagnósticos e vacinação

c) A poliomielite foi considerada erradicada no Brasil desde a década de 50, graças as ações de vigilância epidemiológica

d) Após a notificação de caso suspeito de meningite, deve-se proceder a quimioprofilaxia independente da confirmação do caso

e) Como integrante da equipe de saúde, o auxiliar de enfermagem, desempenha importante papel na Vigilância de Doenças Transmissíveis, buscando os comunicantes domiciliares para que realizem exames diagnósticos e vacinação

17 Foi notificada à Secretaria Municipal de Saúde a suspeita de casos de febre amarela em uma área rural. Após a notificação do caso, a conduta adequada é:

a) realizar a busca ativa, preencher a ficha de investigação epidemiológica e providenciar vacinação de bloqueio para os moradores da área

b) realizar a busca ativa, preencher a ficha de investigação epidemiológica e providenciar a vacinação de bloqueio para os comunicantes domiciliares

c) realizar a busca ativa, preencher a ficha de investigação epidemiológica e providenciar a vacinação para os casos notificados

d) realizar a busca ativa, preencher a ficha de investigação epidemiológica e providenciar a quimioprofilaxia para os comunicantes domiciliares

e) realizar a busca ativa, preencher a ficha de investigação epidemiológica e providenciar a quimioprofilaxia para os moradores da área

18 O auxiliar de enfermagem realiza também a administração de medicamentos por via parenteral. Para fazê-lo corretamente, é necessário realizar cálculos matemáticos, pois nem sempre a dose prescrita é a que existe na Unidade de Internação.

Situação: a prescrição médica do sr. J.L.C. é Amicacina 300 mg e na clínica existem apenas Amicacina 1000 mg/4ml.

Portanto, o auxiliar de enfermagem deve aplicar:

- a) 1,6 ml
- b) 0,6 ml
- c) 1,2 ml
- d) 1,0 ml
- e) 1,4 ml

19 Ao receber o plantão você identifica que o sr. J.L.M., operado há 08 horas, apresenta sensação de peso, de desconforto e sensibilidade dolorosa à palpação da região suprapúbica, além de irritabilidade e sudorese. Tal conjunto de sinais e sintomas caracterizam retenção urinária. Nesse caso o enfermeiro de plantão realizou de imediato:

- a) sondagem vesical de demora
- b) sondagem vesical de alívio
- c) controle hídrico
- d) verificação de sinais vitais
- e) diurese horária

20 Durante a admissão de um paciente adulto em Clínica Médica, você identifica que o mesmo é diabético e refere poliúria, polidipsia e apresenta rubor facial e hálito cetônico. Os sinais e sintomas apresentados pelo paciente caracteriza uma complicação do Diabete, denominada:

- a) lipodistrofia
- b) hipoglicemia
- c) neuropatia diabética
- d) cetoacidose diabética
- e) arteriosclerose

21 A sra. R.S.C. foi admitida há um dia apresentando sinais de inflamação aguda de doença reumática: febre, dor e eritema nas articulações, prostração e anorexia. As ações de enfermagem ao paciente portador de doença reumática incluem:

- a) prevenção de infecções respiratórias
- b) uso de medicação digitalica e repouso absoluto no leito até o desaparecimento dos sinais de inflamação
- c) dieta rica em carboidratos e proteínas e a ingesta de líquidos
- d) tapotagem e exercícios ativos até o desaparecimento dos sinais de inflamação
- e) nenhuma das alternativas está correta

22 As diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) preconizam que:

- a) na reorganização do Sistema de Saúde proposto pelo SUS, o hospital é a porta de entrada do atendimento à população
- b) apenas os serviços públicos da esfera federal, estadual e municipal agregam o SUS
- c) os serviços públicos da esfera federal, estadual e municipal e os serviços privados

credenciados por convênio agregam o SUS

- d) as Unidades Básicas de Saúde oferecem um alto grau de resolutividade para os problemas de saúde mais complexos
- e) Na reorganização do Sistema de Saúde proposto pelo SUS, os ambulatórios não são unidades de referência do hospital

23 “O SUS é uma política pública avançada que tem como princípios, o direito à saúde, a participação da população na gestão dos serviços, a integralidade e a equidade das ações”. (PROFAE, 2001). Nessa linha de pensamento, a estruturação de um novo modelo assistencial deve estar voltado para:

- a) o tratamento das doenças da população
- b) os determinantes das condições de saúde da população
- c) a ampliação da rede hospitalar
- d) os programas de educação em saúde que focalizem somente a ação individual, e não as ações de alcance coletivo
- e) a centralização dos serviços de saúde

24 O princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) que garante o acesso de todo cidadão aos serviços da rede de atenção à saúde, independente de vínculo empregatício ou de contribuição previdenciária, sem preconceitos ou privilégios denomina-se:

- a) princípio da universalidade
- b) princípio da descentralização
- c) controle social
- d) princípio da equidade
- e) princípio da integralidade

25 Dentre os sinais e sintomas apresentados pelo paciente com manifestações clínicas da gastrite, destacam-se: dor epigástrica, vômitos, náuseas, eructação, pirose, digestão difícil e anorexia. Além de administrar os medicamentos prescritos, a equipe de enfermagem deverá orientar o cliente no tocante a:

- a) ingerir dieta hipoglicídica fracionada e não condimentada
- b) ingerir dieta normal fracionada e não condimentada
- c) ingerir dieta hipossódica fracionada e não condimentada
- d) ingerir dieta líquida restrita fracionada
- e) ingerir dieta branda, hipossódica fracionada e não condimentada

26 O controle dos sinais vitais nos pacientes em pós-operatório imediato na sala de recuperação pós-anestésica é muito importante e deve ser aferido:

- a) de 30 em 30 min., se estiver regular de 2/2h
- b) de 15 em 15 min. na primeira hora, se estiver regular, de 30 em 30 min.
- c) de 30 em 30 min., se estiver regular de 3/3h
- d) de 15 em 15 min., se estiver regular de 4/4h
- e) de 15 em 15 min., se estiver regular de 6/6h

27 Tanto o profissional de enfermagem, quanto o usuário que se auto-administra a insulina, devem seguir a seguinte orientação, para garantir a aplicação de forma segura e sem danos. Nesse sentido, a alternativa correta é:

- a) massagear sempre o local da aplicação
- b) inserir a agulha formando um ângulo de 90° independente do tamanho da agulha
- c) fazer o rodízio das áreas de aplicação
- d) agitar o frasco de insulina durante o processo de preparo da medicação
- e) manter o frasco de insulina em temperatura ambiente entre 20 a 25°C

28 A sra. X submeteu-se à drenagem fechada de tórax. Trocar o frasco de drenagem é uma prescrição de enfermagem que será realizada pelo enfermeiro.

Você foi escalado para cuidar da sra. X durante o seu turno de trabalho em Clínica Cirúrgica e um dos cuidados que implementará será:

- a) manter a paciente em repouso absoluto e estimular exercícios respiratórios
- b) estimular a movimentação precoce e pinçar o dreno durante a deambulação
- c) orientar repouso absoluto e manter o dreno pinçado durante a realização do banho no leito
- d) estimular a movimentação precoce e não pinçar o dreno durante a deambulação
- e) estimular ingestão hídrica e pinçar o dreno durante a deambulação

29 No Centro de Saúde tem-se atendido crianças com fontanela deprimida, olhos encovados, língua seca, pele seca, urinando pouco. Os pais relatam que elas tiveram diarreia e as condições do bairro são ruins e faz muito calor. Esses dados indicam a presença de:

- a) infecção urinária
- b) diarreia
- c) verminose
- d) anasarca
- e) desidratação

30 No expurgo ocorre o processo de lavagem do material sujo que será encaminhado ao Centro de Material e Esterilização. O processo de limpeza do referido material é realizado na seguinte seqüência:

- a) imersão de materiais sujos de matéria orgânica em detergentes enzimáticos por cerca de 3 a 5 minutos, em seguida lavagem com água, sabão, com escova de cerdas, enxágüe e secagem
- b) lavagem com água, sabão, com escova de cerdas, imersão de materiais sujos de matéria orgânica em detergentes enzimáticos por cerca de 3 a 5 minutos, enxágüe e secagem
- c) imersão de materiais sujos de matéria orgânica em detergentes enzimáticos por cerca de 10 a 15 minutos, em seguida lavagem com água, sabão, com escova de cerdas, enxágüe e secagem
- d) lavagem com água, sabão, com escova de cerdas, enxágüe e secagem
- e) imersão de materiais sujos de matéria orgânica em detergentes enzimáticos por cerca de 10 a 15 minutos, enxágüe e secagem

31 O paciente cirúrgico recebe assistência de enfermagem nos períodos pré, trans e pós-operatório. Dentre as alternativas, A, B, C, D e E, a correta é:

- a) no pré-operatório imediato o paciente é submetido a exames que auxiliam na confirmação do diagnóstico e que auxiliam o planejamento cirúrgico e, abrange o período desde a indicação para a cirurgia até o dia anterior à mesma
- b) no pré-operatório imediato o paciente é submetido a exames que auxiliam na confirmação do diagnóstico e que auxiliam o planejamento cirúrgico e, abrange o período desde a indicação para a cirurgia até o dia anterior à mesma
- c) o preparo intestinal pode ser realizado através da utilização de laxativos ou lavagem intestinal que deverá ser realizado 1 hora antes da cirurgia
- d) a tricotomia da região operatória deverá ser realizada no dia anterior a cirurgia para diminuir o potencial de infecção hospitalar
- e) a manutenção de jejum entre 6 a 12 horas antes da cirurgia objetiva prevenir complicações respiratórias

32 O auto-exame das mamas é um procedimento importante e a mulher pode contribuir para o controle de sua saúde. Referente à periodicidade recomenda-se que seja realizado:

- a) três vezes por mês e no ciclo menstrual
- b) no período menstrual e duas vezes por mês
- c) uma semana após a menstruação, uma vez por mês
- d) na menarca e uma vez por ano
- e) na menopausa e duas vezes por mês

33 Para a Organização Mundial de Saúde (OMS/2001), a prevenção do câncer cérvico-uterino envolve os seguintes procedimentos:

- a) a citologia oncótica
- b) a citologia oncótica, o exame clínico das mamas
- c) o exame clínico das mamas
- d) o exame da secreção vaginal e o exame clínico das mamas
- e) a cultura e o antibiograma da secreção vaginal e a mamografia

34 Criança de 1 ano deu entrada na Unidade Pediátrica com sinais e sintomas de cansaço, febre, tosse produtiva com expectoração amarelada. Ao assistir esta criança devemos estabelecer como prioridade:

- a) manter a criança em decúbito ventral
- b) administrar antitérmico
- c) administrar oxigênio
- d) comunicar o pediatra
- e) manter temperatura corporal adequada por meio de compressas frias ou banho

35 Se você estivesse medindo a pressão arterial de um paciente, quais os aspectos da técnica deveriam ser observados com relação ao manguito do esfigmomanômetro, para você ter certeza que a técnica foi correta:

- a) posição do manguito em relação ao nível do coração
- b) largura do manguito em relação ao diâmetro do membro
- c) posição do manguito em relação a artéria a ser ocluída
- d) todas as alternativas estão corretas
- e) ajuste do manguito no membro muito apertado ou frouxo

36 Quanto à consistência, as dietas hospitalares classificam-se em:

- a) hiperprotéica, hipoprotéica, hipocalórica, hipossódica, hipolipídica, hipoglicêmica
- b) normal, branda, pastosa, semi-pastosa, líquida completa, líquida restrita
- c) enteral, parenteral
- d) normal, especial
- e) enteral, parenteral, normal, especial

37 Está correto afirmar que:

- a) o esvaziamento intestinal no pré-operatório diminui o risco de trombose e embolia
- b) o período pré-operatório mediato tem por objetivo preparar o cliente para o ato cirúrgico mediante a realização dos seguintes procedimentos: jejum, limpeza intestinal, esvaziamento vesical, preparo da pele e aplicação de medicação pré anestésica
- c) o preparo pré-operatório objetiva identificar apenas as alterações físicas, tais como: hipertensão arterial, presença de feridas infectadas, diabetes
- d) a família tem direitos à orientação clara e precisa sobre o diagnóstico clínico, cirurgia proposta e possível prognóstico, pois o paciente deve ser poupado dessas informações para evitar ansiedade pré-operatória
- e) o período pré-operatório imediato tem por objetivo preparar o cliente para o ato cirúrgico mediante a realização dos seguintes procedimentos: jejum, limpeza intestinal, esvaziamento vesical, preparo da pele e aplicação de medicação pré anestésica

38 O período trans-operatório compreende o momento de recepção do cliente no Centro Cirúrgico e o intra-operatório realizado na Sala de Operação. O auxiliar de enfermagem desempenha a função de circulante da sala cirúrgica. Assim sendo, é sua função:

- a) administrar a medicação anestésica
- b) posicionar corretamente o cliente para o ato cirúrgico e fazer o cateterismo para esvaziamento vesical
- c) fazer a instrumentação cirúrgica, observar o gotejamento dos soros e sangue
- d) suprir material e registrar em prontuário as alterações observadas durante a cirurgia
- e) nenhuma alternativa está correta

39 As complicações pulmonares são as mais sérias e freqüentes no pós-operatório, principalmente em clientes obesos, fumantes, idosos. Dentre as ações de enfermagem que devem ser implementadas destaca-se:

- a) estimular hidratação, realizar exercícios respiratórios e não inibir a tosse
- b) estimular hidratação, realizar exercícios respiratórios e inibir a tosse
- c) estimular a hidratação e evitar exercícios respiratórios e de tosse
- d) umidificar os lábios e a boca, realizar higiene oral e manter a hidratação venosa
- e) proceder a aspiração oro-traqueal para manter vias aéreas superiores permeáveis

40 A movimentação no leito, deambulação precoce, ingestão de líquidos e aceitação de alimentos ricos em celulose são ações de enfermagem que devem ser realizadas com o paciente cirúrgico que apresenta a seguinte complicação pós-operatória:

- a) bexigoma
- b) estase venosa
- c) náuseas e vômito
- d) constipação intestinal
- e) deiscência